

Ginezolex®

Clotrimazol 1%

Cada 100 g de crema contiene:

Clotrimazol	1,00 g
Alcohol bencílico.....	1,00 g
Estearato de sorbitano.....	1,80 g
Polisorbato 80.....	1,35 g
Esperma de Ballena.....	2,85 g
2-Octildodecanol.....	12,00 g
Alcohol cetosteárilico.....	11,00 g
Agua destilada c.s.p.....	100,00 g

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Antimicótico.

INDICACIONES:

Tratamiento de diferentes micosis o infecciones por hongos tales como candida (cándida albicans) candidiasis vaginal, Tinea pedis, tiña crural (pliegues de ingles) y como tiña corporal (Tinea corporis), que habitualmente se acompañan de picazón, ardor. Descamación, agrietamiento y mal olor.

COMO USAR ESTE MEDICAMENTO:

Dosis: Aplicar sobre la zona afectada 2 veces por día hasta su completa absorción o según indicación médica.

En el caso del pie de atleta (micosis de los pies) y tinea corporis (micosis de la piel del cuerpo) la duración del tratamiento es por lo general de 4 semanas y en el caso de tinea cruris (micosis en pliegues) de 2 semanas.

MODO DE USO:

Uso externo. Aplicar una capa fina sobre el área afectada por la mañana y por la tarde.

MODO DE ADMINISTRACIÓN:

Lavar la zona afectada con agua y jabón y secar cuidadosamente. Aplicar una capa fina sobre el área afectada por la mañana y por la tarde. Cubrir las zonas de piel afectadas con una capa de Ginezolex, extendiéndola al menos 2 cm, sobre la piel sana.

Para Tinea Pedis, prestar especial atención a los espacios entre los dedos. Es conveniente utilizar zapatos cómodos, ventilados y cambiarse los zapatos y las medias al menos una vez al día. Si los síntomas persisten por más tiempo o empeoran consulte a su médico.

El uso del producto debe ser supervisado en niños menores de 12 años.

Este producto no es efectivo en el cuero cabelludo y uñas.

Si los síntomas de picazón / malestar o dolencia persisten por más de 4 semanas o empeoran consulte a su médico y/o farmacéutico.

20 g | Crema  Antimicótico Venta libre

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Precauciones: Solo para uso externo. Evitar el contacto con los ojos. No usar en niños menores de 2 años, excepto bajo supervisión médica. Si aparece irritación, o si no presenta mejoría dentro de las 4 semanas de tratamiento (en el caso de Tinea Pedis o tinea corporis) o de 2 semanas (tinea cruris) se deberá suspender el tratamiento y consultar con su médico y/o con su farmacéutico.

Contraindicaciones: No debe ser utilizado en personas con hipersensibilidad conocida al Clotrimazol, a imidazoles en general o a cualquiera de los componentes de la formulación.

Reacciones adversas: En casos aislados pueden presentarse reacciones locales pasajeras, como por ejemplo irritación y sensación de quemazón, que son más frecuentes durante los primeros días de tratamiento. Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte con su médico y/o con su farmacéutico.

Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico y/o farmacéutico antes de usar este medicamento.

PRESENTACIONES:

Pomo que contiene 10 g, 15 g, 20 g, 30 g, 35 g, 40 g, 50 g y 100 g.

SOBREDOSIFICACIÓN:

Ante la eventualidad de una ingestión accidental concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

-Hospital de Pediatría Ricardo Gutierrez:

(011) 4962-6666/2247

-Hospital A. Posadas:

(011) 4654-6648 / 4658-7777

ESTE MEDICAMENTO, COMO CUALQUIER OTRO, DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CONSEVAR EN LUGAR FRESCO A TEMPERATURAS NO MAYORES A 30°C. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O CON SU FARMACÉUTICO

Especialidad Medicinal autorizada

por el Ministerio de Salud Certificado N°41.174

Elaborado por Biosintex S.A.

Salom 657- C1277ABG- C.A.B.A.

Dirección Técnica:

Farmacéutica Leticia Fabbri M.N.11455

