

2% V.L.
Ibuprofeno 2%



Sabor Tutti Frutti

Contiene cada 100 mililitros:

Contiene cada 100 mililitros:
Ibuprofeno 2,00 gramos, Goma xantica, Glicerina, Sorbitol 70%,
Polisorbato 80, Sacarina sódica, Benzoato de sódio, Ácido cítrico
anhidro, Colorante roio punzo 4r, Sabor tutti frutti, Aqua purificada

Sabor Naranja

Contiene cada 100 mililitros:

Ibuprofeno 2,00 gramos, Goma xántica, Glicerina, Sorbitol 70%, Sacarina Sódica, Benzoato de Sodio, Polisorbato 80, Acido Cítrico, Sabor Naranja. Colorante amarillo ocazo. Agua purificada.

- Analgesico (calma el dolor)
- Antifebril (baja la fiebre)
- Antiinflamatorio (reduce la inflamación)

Este medicamento está indicado para el alivio sintomático de dolores (de espalda, de cabeza, musculares, de dientes, menstruales) dolores asociados a estados gripales y para bajar la fiebre.

**LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION
ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO**

Administrar de acuerdo con las indicaciones de la siguiente tabla. Es preferible establecer la dosis de acuerdo al peso del niño, de no ser posible tomar como referencia la edad. En aquellos niños con problemas gástricos se recomienda ingerir el producto con las comidas. En caso necesario repetir la dosis cada 8 horas. No administrar más de 3 veces al día.

Edad (años)	Peso (Kilos)	Dosis (mililitros)
Menores de 2	Menos de 11	Consulte a su médico
2 a 3	11 a 15	5
4 a 5	16 a 21	7.5
6 a 8	21 a 27	10
9 a 10	27 a 32	12.5
Más de 10	Más de 32	15



Servicio de atención al consumidor:
0810 777 6327 - consultas@biosintex.com.ar
www.biosintex.com.ar



AGITAR BIEN EL PRODUCTO PREVIAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN

PERSONAS QUE NO PUEDEN RECIBIR IBULGIA® 2% V.L.

- Es alérgico al ibuprofeno, aspirina, a otros antiinflamatorios similares o a otros ingredientes del producto.
- Tiene o ha tenido úlcera en el estómago.
- Está tomando otros productos conteniendo ibuprofeno u otros antiinflamatorios.
- Padece de enfermedad de hígado, riñón o corazón.
- No utilizar contra el dolor de estómago.

CUIDADOS QUE SE DEBEN TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO

- Es Mayor a 65 años.
- Tiene asma o alergia
- Tiene presión arterial
- Tiene problemas circulatorios
- Tiene problemas de estómago (ardor estomacal, acidez)
- En el área dolorida hay enrojecimiento o tumefacción
- El dolor de garganta es severo, se presenta con dolor de cabeza, fiebre, erupción, náuseas y/o vómitos.
- Aunque el ibuprofeno posee las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, nunca deben administrarse juntos, ante esta eventualidad consulte con su médico.
- Si usted consume tres (3) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

CUIDADOS QUE SE DEBEN TENER MIENTRAS SE TOMA ESTE MEDICAMENTO:

- No obtiene alivio de los síntomas en el término de un día de tratamiento, o el dolor y/o la fiebre empeoran.
- En el caso de dolor de garganta, si dura más de 2 días con igual intensidad.
- No usar durante más de 3 días para aliviar la fiebre y 5 días para el dolor.
- Si está deshidratado (pérdida de mucho líquido) debido a vómitos, diarrea o falta de ingesta de líquidos.
- Aparecen síntomas nuevos
- Este medicamento puede producir náuseas, acidez, dolor estomacal, síntomas en el tránsito intestinal. Si ocurre esto consulte a su médico y suspenda su uso.

- Experimenta alergias como erupción en la piel y picazón, que puede acompañarse de dificultad para respirar, hinchazón de labios, lengua, garganta o cara.
- Experimenta empeoramiento de su asma.

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez" Tel.: (011) 4062-6666/2247
Hospital General de Niños "Dr. Pedro de Elizalde" Tel.: (011) 4300-2115/ 4362-6063
Hospital Nacional "Prof. A. Posadas" Tel.: (011) 4654-6648/ 4658-7777
Centro de Asistencia Toxicológica de La Plata Tel.: (0221) 451-5555

Envase conteniendo un frasco de 90 mililitros sabor naranja y 90 mililitros sabor tutti frutti.
Envase conteniendo un frasco de 120 mililitros sabor naranja.

Conservar en ambiente seco a temperaturas inferiores a los 30° C.

NO UTILIZAR DESPUÉS DE SU FECHA DE VENCIMIENTO. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Esp. Med. Aut. M. Salud – Certificado N° 54597
Laboratorio BIOSINTEX S.A
Dirección Técnica Diego R. Montenegro, Farmacéutico
Elaborado en: Salom 657 C1277ABG – CABA
Fecha última de revisión: 05 / 13

Consultas: 0810 777 6327
MAT Responde: 0800-333-1234
O por mail:
consultas@biosintexofar.com
Web: www.biosintexofar.com

Página Web: www.biosintexofar.com