PANCREOLIPASA TECHSPHERE
PANCREOLIPASA

POLVO-CÁPSULAS CON MICROGRÁNULOS GASTRORRESISTENTES

Industria Argentina — Venta bajo receta

FÓRMULA CUALICUANTITATIVA:

Pancreolipasa Techsphere polvo por 100 gramos
Cada mg de polvo contiene:
LIPASA……. 24 U USP
AMILASA……100 U USP
PROTEASA……100 U USP

Pancreolipasa Techsphere 4M
Cada cápsula contiene:
LIPASA…… 4000 U USP
AMILASA……20000 U USP
PROTEASA……25000 U USP
CÁPSULA DE GELATINA RÍGIDA…… 1

Pancreolipasa Techsphere 12M
Cada cápsula contiene:
LIPASA……12000 U USP
AMILASA……39000 U USP
PROTEASA……39000 U USP
CÁPSULA DE GELATINA RÍGIDA…… 1

Pancreolipasa Techsphere 18M
Cada cápsula contiene:
LIPASA……18000 U USP
AMILASA……58500 U USP
PROTEASA……58500 U USP
CÁPSULA DE GELATINA RÍGIDA…… 1

Pancreolipasa Techsphere 20M
Cada cápsula contiene:
LIPASA……20000 U USP
AMILASA……65000 U USP
PROTEASA……65000 U USP
CÁPSULA DE GELATINA RÍGIDA…… 1

Pancreolipasa Techsphere 25M
Cada cápsula contiene:
LIPASA……25000 U USP
AMILASA……1000 U USP
PROTEASA……18000 U USP
CÁPSULA DE GELATINA RÍGIDA…… 1

Presentaciones:
Cápsulas envasadas en blíster de Al/PVC por 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 60, 100 y 120 cápsulas para la venta al público y 500 y 1000 unidades para la venta hospitalaria.

Acción Farmacológica
Repositor pancreático de enzimas. Digestivo.

Acción Terapéutica
Las cápsulas contienen un concentrado de enzimas pancreáticas con una cubierta entérica que las protege de su destrucción.
Las enzimas proteolíticas, amilolíticas y lipolíticas de la pancreolipasa potencian la digestión de proteínas, almidones y grasas en el tracto gastrointestinal, sobre todo en el duodeno y yeyuno. Su actividad es muy superior a la de la pancreatina.

Indicaciones
Insuficiencia pancreática (pancreatitis crónica, fibrosis quística y obstrucción ductal por neoplasia). Esteatorrea asociada con síndrome posgastrectomía, con resección intestinal para disminuir la mala absorción.

Posología
Adultos: 1 a 3 cápsulas antes o durante las comidas, con ajuste de la dosis según necesidades y tolerancia. En deficiencias severas puede aumentarse la dosis hasta 8 cápsulas. Dosis pediátricas: 1 a 3 cápsulas durante las comidas.

Contraindicaciones
Hipersensibilidad al principio activo.

Precauciones
Administrar antes de las comidas o con ellas, para que el efecto terapéutico sea máximo; no masticar las cápsulas e ingerirlas con abundante líquido.

Recomendaciones para la administración oral
Las cápsulas deben tomarse enteras sin masticar, con líquido suficiente durante las comidas. Cuando la ingestión de las cápsulas sea difícil (por ejemplo, en niños pequeños y ancianos) estas se pueden abrir y mezclar su contenido con dieta blanda que no requiera masticar o con algo de líquido; esta comida o líquido debe tener un carácter ácido (por ejemplo, zumo de naranja). Dicha mezcla debe tomarse inmediatamente, para evitar que se dañe la cubierta gastrorresistente de las microesferas.
Debido a que el calor puede inactivar el preparado, el alimento con el que se mezcle no debe estar demasiado caliente.

Administración por sonda nasogástrica
Las cápsulas NO SE DEBEN TRITURAR. Abrir la cápsula, diluirla en un líquido de carácter ácido (por ejemplo, zumo de naranja), y administrar inmediatamente. Posteriormente lavar la sonda con 10-15 ml de agua.
Nota: si se trituran se rompe la cubierta que protege a las microesferas que contiene cada cápsula, y el principio activo podría ser inactivado por el pH ácido del estómago.

Advertencias
En la insuficiencia pancreática se recomienda una dieta alta en calorías, rica en proteínas y pobre en grasas.

Reacciones adversas
Hematuria, artralgias, diarreas, náuseas, calambres, irritación bucal, disnea, que en general sólo ocurren con dosis elevadas.

Interacciones
El uso simultáneo con antiácidos que contengan carbonato de calcio o hidróxido de magnesio puede disminuir la eficacia de la pancreolipasa. Los suplementos o preparados de hierro pueden no ser absorbidos en su totalidad cuando se usan en forma simultánea con pancreolipasa.

Interferencia en la absorción de otros medicamentos
Las preparaciones con enzimas digestivas que contienen enzimas hidrolizadoras de carbohidratos pueden neutralizar la acción del miglitol. No se debe administrar concomitantemente el miglitol y estas enzimas.

Sobredosis o ingestión accidental
En caso de sobredosis, comunicarse inmediatamente con:
Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 /2247
Unidad Toxicológica del Hospital Posadas: (011) 4658-7777

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Forma de conservación
Conservar a temperatura ambiente menor a 30 °C al abrigo de la luz en su estuche original.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud – Certificado N° 51.835.
Dirección Técnica: Leticia Fabbri MN 11.455 – Farmacéutica.
BIOSINTEX S.A. – Salom 657 C1277ABG C.A.B.A.

Elaborado en: Virgilio 844/856 CABA. Tres Arroyos 1829 CABA

Biosintex

TEC12005/02