PROSPECTO
GINEZOLEX
CLOTRIMAZOL
Crema

VENTA LIBRE **INDUSTRIA ARGENTINA**

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO

¿QUÉ CONTIENE GINEZOLEX CREMA?

GINEZOLEX Crema
Cada 100 gramos contiene:

CLOTRIMAZOL 1,00 gramo. Excipientes: Alcohol bencílico 1,00 gramo, Estearato de sorbitano 1,80 gramos, Polisorbato 80 1,35 gramos, Esperma de ballena 2,85 gramos, 2-Octildocecanol 12,00 gramos, Alcohol cetoestearílico 11,00 gramos, Agua purificada c.s.p. 100 gramos.

NO USAR SI EL ENVASE NO ESTÁ INTACTO

ACCIÓN:

Antimicótico.

¿PARA QUÉ SE USA GINEZOLEX CREMA?

Ginezolex crema se utiliza para el tratamiento de infecciones por hongos en la región genital.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR GINEZOLEX CREMA?

Menores de 16 años.

No usar en caso de alergia al Clotrimazol, al alcohol cetoestearílico o a cualquiera de los excipientes (reacciones alérgicas producidas por este medicamento u otros similares).

CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Si esta es la primera vez que usted ha presentado síntomas asociados a una infección vaginal, consulte con su médico antes de emplear cualquier tratamiento.

Para su uso exclusivo en adultos y mayores de 16 años.

Si Ud. está tomando algún medicamento, está embarazada o dando de amamantar consulte a su médico antes de usar este medicamento.

Si usted duda de padecer micosis vaginal consulte con su médico antes de utilizar este producto.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY USANDO ESTE MEDICAMENTO?

Si los síntomas como picazón y ardor persisten más de 7 días consulte a su médico.

Si olvida colocarse la crema por la noche, puede continuar el tratamiento a la mañana siguiente. Para lograr una eliminación completa de la infección y prevenir su repetición no se deberá

interrumpir el tratamiento, dado que en este caso la infección no estará completamente curada y puede volver.

El tratamiento no se debe suspender mientras existan los síntomas, y deberá continuarse hasta completar los 6 días.

Use ropa interior de algodón y ropas flojas. Lávese diariamente. Luego de ir al baño, límpiese de adelante hacia atrás, ya que la infección por cándida puede ser transmitida desde el intestino. Cambie regularmente las toallas higiénicas. Trate de evitar el uso de calzas interiores de malla, ropa interior de nylon y jeans ajustados. Trate de evitar el lavado con jabones perfumados o el uso de desodorantes vaginales.

No se lave con esponjas o toallas de baño frotando con fuerza, y evite baños calientes con aceites fuertemente perfumados.

El producto no debe utilizarse al mismo tiempo con tampones, duchas vaginales, espermicidas, productos de látex como preservativos y diafragmas.

No debe iniciar el tratamiento durante la menstruación, o bien, procurar terminarlo antes de la misma.

Si ha presentado más de 2 infecciones por cándida en los últimos 6 meses, antes de emplear el producto consulte a su médico.

Si es menor de 16 años o mayor de 60, antes de emplear este producto consulte a su médico.

Este medicamento sólo debe ser utilizado en forma intravaginal y en los órganos genitales externos. No coloque el producto en la boca ni lo ingiera. Si la crema es deglutida accidentalmente llame a su médico de inmediato o concurra al hospital más cercano. Evite el contacto con los ojos.

Se recomienda no tener relaciones sexuales durante el uso de esta medicación ya que la infección puede ser transferida a su pareja.

Cuando se utilizan cremas vaginales la seguridad y eficacia de los productos de látex como ser preservativos se encuentra disminuida.

Los síntomas de la micosis vaginal deben desaparecer dentro de los 7 días de iniciado el tratamiento.

Si no observa mejoría después de 7 días consulte a su médico.

Visite a su médico lo antes posible y no use este producto en caso de presentar cualquiera de los siguientes síntomas: hemorragia vaginal; dolor en la parte baja del abdomen; dolor de espalda, dolor que se irradia al hombro, fiebre (38 °C o mayor); náuseas; secreción vaginal con olor fétido.

En casos aislados pueden presentarse reacciones secundarias locales pasajeras, como por ejemplo irritación, sensación de quemazón y picor, que no suelen determinar la supresión del tratamiento y son más frecuentes durante los primeros días del mismo.

Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico.

Con el uso del producto pueden aparecer reacciones alérgicas, ampollas, molestias, dolor, edema, irritación, descamación, picazón, ardor, dolor abdominal. Las reacciones adversas son similares a los síntomas de la micosis vaginal.

Si observa que el enrojecimiento, el ardor y la irritación empeoran, consulte a su médico inmediatamente.


SOLO USO EXTERNO.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Aplicar Ginezolex Crema 2 o 3 veces en el día, sobre la zona afectada, efectuando un ligero masaje. El tratamiento se extenderá entre 1 semana y 1 mes según, el tipo, tamaño, localización e intensidad de la micosis. Como criterio general, una vez desaparecidos los síntomas se continuará el tratamiento de 7 a 15 días más.

Ginezolex con aplicador: Tras abrir el pomo, se enrosca el aplicador a la boca de éste, y presionando el pomo, se llena el aplicador vaginal. Se introduce profundamente en la cavidad vaginal con una carga del aplicador (aprox 5 g) por la noche durante 6 días consecutivos.

La aplicación se realiza con mayor facilidad en posición acostada y con las piernas ligeramente flexionadas. Debido a que tanto la vagina como la vulva están generalmente afectadas deberá ser realizada la aplicación sobre ambas áreas (desde los órganos genitales externos hasta el ano en la mujer). La duración del tratamiento es de 6 días, si los síntomas persisten por más de 7 días usted debe consultar al médico.



¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI USÉ MAS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un Centro de Toxicología, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

CENTROS DE TOXICOLOGÍA

- Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez" (Gallo 1330, CABA): 0800-444-8694 / (011) 4962-6666 / 2247
- Hospital General de Niños Pedro Elizalde (Montes de Oca 40, CABA): (011) 4363-2100 / 2200 int. 6217
- Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández (Cerviño 3356 C1425AGP CABA): (011) 4808-2600
- Hospital Nacional Posadas (Av. Marconi y Pte. Illia, El Palomar, Buenos Aires): (011) 4654-6648 / 4658-7777 / Línea Gratuita Nacional: 0-800-333-0160

- Hospital De Niños "Sor María Ludovica" (Calle 14 1631, B1904 La Plata, Buenos Aires): (0221) 453-5901 / Línea Gratuita: 0-800-222-9911

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

0800-333-1234 ANMAT RESPONDE

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

FORMA DE CONSERVACIÓN

Conservar a una temperatura no mayor a 30 °C.

Una vez abierto debe mantenerse bien cerrado.

PRESENTACIÓN

Pomos conteniendo 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50 y 100 gramos de crema (sin aplicadores), siendo estos últimos dos de uso hospitalario exclusivo. Caja de uso hospitalario conteniendo 25 pomos x 30 g sin aplicador.

Pomo conteniendo 30 g de crema (con aplicador).

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud Certificado N° 41.174

LABORATORIO BIOSINTEX S.A.
Salom 657 C1277ABG C.A.B.A. Buenos Aires - Argentina.
Elaborado en: Salom 657 C1277ABG C.A.B.A.
Dirección Técnica: Leticia Fabbri – Farmacéutica

Fecha de última revisión del prospecto autorizado por la ANMAT: 03/2025

0810 777 6327

E-mail: consultas@biosintex.com.ar

www.biosintex.com.ar

Servicio de Atención al Consumidor